

DIAGNOSES PRÉLIMINAIRES DE CURCULIONIDES DE MADAGASCAR,

PAR M. A. HUSTACHE.

(2° PARTIE.)

Lobotrachelus variegatus nov. sp.

Fémurs antérieurs sans dilatation spéciale en dessous. Noir brun, le rostre, les pattes rouges, les antennes et les tarses testacés; revêtu de squamules cendrées formant des linéoles claires sur les élytres le long de la suture, à la base des interstries, vers leur milieu et au sommet. Longueur, 2 millimètres.

Menemachus rhinonchoides nov. sp.

Ovale oblong, noir brun, densément revêtu d'une squamosité d'un brun fauve, variée de cendré, plus claire par places, particulièrement sur les bords du prothorax, la suture ornée, près du milieu, d'une courte tache rectangulaire blanche. Longueur, 3 millimètres.

Parasycites NOV. GEN. Trypétides.

Rostre différent suivant les sexes, peu arqué, plus large et plus aplati chez le ♂, ses scrobes commençant vers son tiers antérieur (♂) ou son milieu (♀) et dirigés contre le bord inférieur des yeux. Hanches antérieures globuleuses, médiocrement séparées, le prosternum devant elles, long et plan. Mésosternum situé dans un plan légèrement plus bas que le métasternum, la saillie intercoxale légèrement penchée en avant. Deux premiers segments abdominaux égaux, longs, leur suture fine, arquée au milieu, les 3° et 4° segments ensemble plus courts que le 2°. Fémurs robustes, claviformes. Ongles simples et assez grands.

Parasycites sexspilotus nov. sp.

Oblong, noir, le rostre, les antennes, les pattes rougeâtres, peu brillant, couvert d'une pubescence extrêmement courte, imperceptible, les

élytres ornés de 6 petites macules cendrées, dont 4 disposées presque en carré sur la déclivité postérieure et deux sur la base du 3^e interstrie. Longueur, 4,5-5 millimètres.

Baris Alluaudi nov. sp.

Noir brillant, les interstries des élytres n'ayant que des vestiges de points, lisses, brillants, le 3^e relié au 9^e avant le sommet. Prothorax à ponctuation assez forte, écartée sur le disque, serrée sur les bords. Longueur, 2-2,1 millimètres.

Baris Decorsei nov. sp.

Oblong, noir, assez brillant, les tarses et antennes roux. Élytres ornés de deux petites taches cendrées, l'une sur la base du 3^e interstrie, l'autre sur l'épaule, les stries profondes, les interstries larges munis chacun d'une série de points serrés, ovales. Ponctuation du prothorax assez forte et serrée, plus fine en avant. Longueur, 3 millimètres.

Baris ambovombensis nov. sp.

Ovale, noir, submat, Élytres à stries ponctuées, les points entamant les interstries, les interstries à points occupant toute leur largeur, au moins en avant. Prothorax à ponctuation forte, serrée, nullement confluent même sur les bords. Longueur, 3-3,5 millimètres.

Baris hovanus nov. sp.

Diffère de l'espèce précédente par la ponctuation du prothorax confluent en rides sur le disque et les flancs, par les interstries des élytres fortement relevés en arrière où ils forment, par leur jonction, une carène assez élevée. Longueur, 3,2-3,6 millimètres.

Chloebaris n. nov. pour *Pseudobaris* Fairm.

Ann. Soc. Ent. Belg., 1897, p. 184.

Le genre *Pseudobaris* Fairm. n'a rien de commun avec celui du même nom publié par Le Conte en 1876.

EPIPHYLAX CRIBRICOLLIS Fairm. = *Secania cruralis* Fairm.

EPIPHYLAX SEPTEMPUNCTATUS Fairm. = *Secania punctulicollis* Fairm.

EPIPHYLAX CERVINOPICTUS Fairm. = *Epiphylax punctulicollis* Fairm.

EPIPHYLAX VARIEGATUS Fairm. = *E. griseostriatus* Fairm. = *Alsirrhinus histrio* Fairm.

Decorseia NOV. GEN. Campyloscérides.

Voisin d'*Alsirrhinus* Fairm. dont il diffère par les caractères suivants : Yeux presque ronds, séparés en dessus par un intervalle bien plus large que leur diamètre; massue antennaire articulée, plus courte que le funicule; pattes antérieures à peine plus longues que les postérieures; fémurs pédonculés, fortement claviformes, les 4 antérieurs très fortement dentés, tous frangés en dessous, les postérieurs n'atteignant pas le sommet des élytres; tibiais peu comprimés, onguiculés et brièvement mucronés au sommet; pygidium peu découvert.

Decorseia elegantula nov. sp.

Allongé, subcylindrique, brun rouge, les antennes, le sommet du rostre, les tarses plus clairs, orné en dessus d'un dessin squamuleux blanc formé d'une bande sur les côtés du prothorax, et sur les élytres d'une bordure basale d'une ligne suturale et de deux taches de chaque côté. Longueur, 3-3,5 millimètres.

Histeropus NOV. GEN. Campyloscérides.

Pattes courtes, épaisses; fémurs épais, comprimés, les 4 postérieurs finement dentés; tibiais excessivement élargis, alvéolés, leur tranche supérieure pubescente et avec une ligne de points, la troncature apicale très oblique, plus longue que la moitié du tibia, tous munis au sommet d'une dent et d'un ongle interne; tarses très grêles et assez courts, incomplètement spongieux en dessous; ongles simples.

Type : *Sphenophorus subcostatus* Fairm.

Rhynchohovanus N. NOV. pour *Cylindrocephalus* Faust, 1893,
préoccupé par *Cylindrocephalus* Motsch., 1859.

Procosmopolites NOV. GEN. près *Cosmopolites* Chev.

Ce genre diffère de *Cosmopolites* par les antennes dont le 7^e article n'est pas distinct de la massue, l'écusson allongé, les tibiais tous striés et carénés, leur troncature apicale ni dentée ni crénelée, le 6^e article tarsal plus large, la saillie postcoxale du prosternum obtusément bituberculée,

les épimères mésothoraciques bien plus étroits, le 2° segment ventral (soudé au 1^{er}) plus court que les 3° et 4° réunis.

Type : *Sphenophorus picirostris* Fairm.

Perissoderes oblongus nov. sp.

Prothorax subcarré, sa base faiblement bisinuée, le lobe médian petit et aigu, l'écusson invisible, la ponctuation assez forte, écartée.

Elytres à interstries convexes. Longueur, 9 millimètres.

Myocalandra hovana nov. sp.

Deuxième article du funicule antennaire beaucoup plus long que le 1^{er}, 2° segment ventral un peu moins long que les 3° et 4° réunis. Noirâtre, dénudé. Prothorax à ponctuation grosse, confluyente en rides, laissant libre une ligne médiane lisse. Élytres subréticulés, les points grands, carrés et peu profonds, les interstries très étroits. Longueur, 5-6,5 millimètres.

Myocalandra intermedia nov. sp.

Diffère de l'espèce précédente par la conformation du rostre, la ponctuation du prothorax assez forte et très serrée mais formant à peine quelques rides dans le milieu, ce dernier sans ligne lisse. Élytres avec une macule humérale et apicale claires, les interstries alternes un peu relevés.

Longueur, 5-6 millimètres.

Cossonus hovanus nov. sp.

Voisin de *C. impressicollis* Fairm.; peu convexe, brillant, noir, chaque élytre avec une bande discale élargie en arrière et rouge, les pattes d'un ferrugineux obscur; prothorax beaucoup plus long que large, son impression profonde, allongée. Longueur, 4-5 millimètres.

Cossonus Alluaudi nov. sp.

Voisin de *C. crenulatus* Fairm. Pattes noires. Rostre assez fortement élargi en avant, assez densément pointillé en dessus. Ponctuation du prothorax confluyente tout au moins en avant. Interstries aussi larges que les stries, subconvexes, éparsément pointillés. Longueur, 4-5,5 millimètres.

Cossonus filiformis nov. sp.

Étroit, noir, brillant, la tête et le rostre lisses, la ponctuation du prothorax peu serrée. Espèce voisine de *C. fortipes* Fairm. Longueur, 3,5 millimètres.

Cossonus imerinæ nov. sp.

Noir, brillant, le prothorax subconique, sa base notablement plus étroite, que les élytres, son impression courte et légère, sa ponctuation espacée, médiocre. Stries à points serrés, les interstries plus larges que les stries, subplans, imperceptiblement pointillés. Longueur, 5-6 millimètres.

Rhyncolus nossibianus nov. sp.

Allongé, noir brillant, les pattes et les antennes d'un brun de poix. Rostre un peu plus long et un peu plus étroit que la tête, à ponctuation médiocrement forte. Prothorax oblong, sa plus grande largeur vers le tiers postérieur; à points médiocres, peu serrés, avec une ligne médiane lisse. Élytres à stries profondes, les interstries de la largeur des stries, peu convexes, transversalement rugueux et à pointillé assez serré. Longueur, 4,7-5 millimètres.

Dryophthorus Alluaudi nov. sp.

Élytres carénés latéralement au sommet, la carène formée par l'épaississement du 4^e interstrie. Prothorax subcylindrique, convexe, couvert de gros points, médiocrement serrés. Élytres à stries sulciformes, ponctuées au fond, les interstries costiformes, élargis en avant. Longueur, 3,5-4 millimètres.

Apoderus (Trachelophorus) Alluaudi nov. sp. ♂.

Noir, peu brillant, abdomen rougeâtre; pattes d'un brun foncé, les tibias et tarses plus clairs. Stipe cylindrique, très long, du triple de la longueur de la tête, cette dernière profondément fovéolée sur le front. Antennes courtes, non épaissies, dépassant peu la base de la tête. Longueur, 11 millimètres.

Apoderus (Trachelophorus) madegassus nov. sp.

Forme de *A. Ardea* Gyll., mais plus petit. Noir, avec un léger reflet bleuâtre, les tibias et tarses jaunes. Longueur, 5-9 millimètres.

APODERUS (TRACHELOPHORUS) FLAVICORNIS Gyll. var. **Shawi** nov. var.

Fémurs en partie foncés, de même que les antennes; pygidium et abdomen rembrunis.

APODERUS (TRACH.) FILICOLLIS Fairm. = *A. vittipennis* Fairm.

APODERUS (TRACH.) ABDOMINALIS Gyl. = *A. foveicollis* Fairm.

APODERUS (TRACH.) FLAVICORNIS Gyl. = *A. flaviventris* Fairm.

Euops longipes nov. sp.

Noir, les élytres violacés, les tibias et tarses brun de poix. Prothorax arrondi sur les côtés, le disque lisse, à pointillé excessivement fin même sur les bords. Points des stries espacés, leurs intervalles plus grands qu'eux; interstries larges et plans. Pattes allongées. Longueur, 2 millimètres.

Euops Alluaudi nov. sp.

Diffère de *E. longipes* par le prothorax à bords latéraux très peu arqués, les stries des élytres à points ronds, profonds, séparés par des intervalles aussi larges que les points. Longueur, 2,5-2,7 millimètres.

Euops luteicornis nov. sp.

Antennes, tibias et tarses d'un testacé clair, prothorax verdâtre, élytres d'un bleu noir. Prothorax finement pointillé au milieu, ponctué sur les bords. Interstries convexes. Longueur, 2-2,5 millimètres.

Lagenoderus Fairmairei nov. sp.

Cuivreux, peu brillant, une bordure apicale aux élytres, le ventre, les 4 pattes postérieures, les tibias et tarses antérieurs d'un jaune testacé. Rostre de la longueur de la tête. Prothorax brusquement étranglé au delà du milieu, la partie rétrécie presque aussi longue que la portion large. Élytres à ponctuation distincte, couverts d'élévations analogues à celles de *L. gnomoides* White. Longueur, 7-8 millimètres.

LAGENODERUS (ATTELABUS) DENTIPENNIS Gylh. = *L. coniferus* Fairm.

Salacus Decorsei nov. sp.

Se distingue de *S. Perrieri* Fairm. par la pubescence plus longue, le prothorax transversal à bords fortement arqués, sa plus grande largeur en arrière du milieu, le rostre plus long, les tarses plus robustes à 1^{er} article plus long. Longueur, 4-4,2 millimètres.